Enfermedad de los pichones jóvenes que les causa una muerte temprana sin síntomas específicos. Las palomas adultas que se curan se transforman en portadoras y siguen eliminando salmonellas, por lo que siempre es preferible eliminarlas. Al empollar pueden transmitir la enfermedad a través de los poros de la cáscara de los huevos.

Agente causal:
Salmonella Typhimurium

Transmisión:
Oral: Por el alimento o el agua de bebida.
Aérea:Por inhalación del polvo.
Del ovario al huevo.

Síntomas:
Cuatro formas:
1 - Intestinal: Diarrea con heces espesas rodeadas de mocos, elementos no digeridos en agua sucia de color pardo o verde, espumoso y maloliente. Engrasamiento de la cloaca. Adelgazamiento.
2 - Articular: del intestino pasa a la sangre y de ahí a las articulaciones de mayor movimiento (codo). Ala caída.
3 - Orgánica: ataca todos los órganos manifestándose con una respiración corta y debilitamiento general.
4 - Nerviosa: ataca el cerebro y la médula espinal produciendo:

- pérdida de equilibrio
- parálisis
- tortícolis (similar a New Castle)

Diagnóstico:
Serológico, es decir los anticuerpos de la sangre de los animales infectados.

Tratamiento:
Antibióticos: Tetraciclinas, Enrofloxacina, Furazolidona.
Mínimo 15 días, por eso no conviene.

Profilaxis:
Limpieza y desinfección (por lo menos semanal) y 1 - 2 días de antibióticos y cada 15 días Vitaminas
Es una ZOONOSIS (puede contagiarse al hombre por un contacto muy estrecho)